

Urologie

Urodynamisch onderzoek



Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Binnenkort wordt bij u een urodynamisch onderzoek gedaan om te kijken wat de oorzaak is van uw plasklachten.

Urodynamisch onderzoek kan worden gedaan bij ongewild urineverlies (incontinentie) en moeilijk kunnen plassen (obstructie). Ook als er in combinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen zijn (bijvoorbeeld van het zenuwstelsel) of als de oorzaak van de klachten niet duidelijk is, kan urodynamisch onderzoek meer inzicht geven in de oorzaak van uw klachten.

Wat is een urodynamisch onderzoek

Tijdens een urodynamisch onderzoek wordt bekeken hoe uw blaas en de afsluiting van uw blaas werken. Het is een inwendig onderzoek. Via de plasbuis en de endeldarm worden katheters (dunne slangetjes) ingebracht. Hiermee kunnen metingen worden gedaan van de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden verwerkt via de computer.

De voorbereiding en het onderzoek duren samen ongeveer 45 minuten.

Belangrijk

Als u blaasontsteking hebt, kan het onderzoek niet doorgaan.

Vorbereiding

- U hebt van de polikliniek Urologie een plaslijst gekregen. Deze neemt u ingevuld mee naar het onderzoek.
- Als u ongesteld bent, kan het onderzoek gewoon doorgaan. Misschien vindt u het zelf wat vervelend. Een tampon moet voor het onderzoek wel verwijderd worden.
- Het onderzoek gebeurt op de polikliniek Urologie en wordt gedaan door een verpleegkundige.
- U wordt gevraagd uw onderkleding uit te doen. De kleren van het bovenlichaam en sokken mag u aanhouden.
- De vagina of de voorhuid wordt schoongemaakt met wattenbolletjes met water.
- Omdat uw blaas voor het onderzoek leeg moet zijn, moet u eerst uitplassen.
- Voordat er met het onderzoek wordt begonnen, wordt uw plas gecontroleerd op ontstekingen.

Het onderzoek

Eerst wordt gemeten hoeveel urine er na het plassen is achtergebleven in uw blaas. Dit wordt gemeten met een katheter (dun slangetje) die via de plasbuis in de blaas wordt gebracht. Na het meten wordt de katheter weer verwijderd.

Daarna wordt er een dun drukkathetertje via de plasbuis in de blaas gebracht om tijdens het onderzoek de druk in de blaas en de plasbuis te meten.

Een tweede drukkathetertje wordt in de endeldarm gebracht voor het meten van de buikdruk. Het inbrengen van de kathetertjes is niet pijnlijk maar kan wel een vervelend gevoel geven. De kathetertjes worden met een pleister op de huid vastgeplakt.

Op de billen rondom de anus worden enkele elektroden (plakkers) bevestigd waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren wordt gemeten.

Het onderzoek gebeurt in zittende houding, op een speciale onderzoektafel, boven een speciaal toilet. Via het kathetertje wordt de blaas gevuld met een verwarmde zoutoplossing. Tijdens het vullen meet de computer de druk in de blaas. Het kathetertje in de endeldarm meet de druk in de buik.

U wordt een paar keer gevraagd om te hoesten of te persen. Dit is met name van belang bij patiënten met ongewild urineverlies (incontinentie).

Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen, moet u dit aangeven, maar u mag dan nog niet plassen.

De blaas wordt verder gevuld, tot u aangeeft dat u sterke drang tot plassen hebt en de plas niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt.

Als de verpleegkundige het aangeeft, kunt u uitplassen langs het kathetertje in de blaas. Daarna worden de kathetertjes en de plakkers verwijderd en is het onderzoek afgelopen.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u bijna direct naar huis. Gebruik van uw eigen auto of het openbaar vervoer is geen probleem.

De behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Bijwerkingen

- U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen.
- U kunt een verhoogde plasdrang hebben. Dit komt doordat de plasbuis dan geïrriteerd is door de katheters.
- In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis.

Bovengenoemde klachten kunnen soms enkele dagen duren. Dit is niet verontrustend.

Belangrijk

Het is belangrijk om na het onderzoek extra te drinken.

Wanneer moet u contact opnemen

U moet contact opnemen als:

- U veel pijn hebt bij het plassen.
- U koorts krijgt (hoger dan 38,5°C).

De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur.

T: 0515 - 48 84 00.

Tenslotte

Deze folder geeft u algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw uroloog aan u verteld worden.

Antonius Ziekenhuis

Bolswarderbaan 1, Sneek

T 0515 - 48 88 88

Urkerweg 4, Emmeloord

T 0527 - 62 04 60

Urkerweg 1, Emmeloord

T 0527 - 48 87 77

Thuiszorg Zuidwest Friesland

Bolswarderbaan 3, Sneek

T 0515 - 46 11 00

www.mijnantonius.nl