

Urologie

Operatie om de kromstand van uw penis te herstellen

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over een Cavernoplicatie. Dit is een operatie om de kromstand van uw penis te herstellen.

De ziekte van Peyronie

De penis bestaat uit 2 zwellichamen, die beiden zijn bedekt met een laagje bindweefsel. Bij de ziekte van Peyronie ontstaat er teveel bindweefsel in één van de zwellichamen. Daardoor rekt dat zwellichaam tijdens een erectie niet goed mee met het andere zwellichaam. Er ontstaat dan een kromming.

De ziekte komt vooral tussen de 40 en 60 jaar. De precieze oorzaak is niet bekend. Het teveel aan bindweefsel zou het gevolg kunnen zijn van kleine beschadigingen aan de penis, die in de loop van het leven zijn ontstaan. Ook zou een erfelijke aanleg een rol kunnen spelen.

Klachten

Er zijn 4 duidelijke klachten:

- Verharding in de wand van de penis.
- Verkromping en soms ook verkorting van de penis tijdens de erectie.
- Pijnklachten tijdens de erectie.
- Erectiestoornissen.

Na ongeveer een jaar veranderen de klachten niet meer: de kromstand wordt niet meer erger en de erectie doet geen pijn meer.

Behandeling

Er bestaat nog geen behandeling om de ziekte van Peyronie te genezen. Wel kan de kromstand van de penis worden hersteld met een operatie.

Een operatie kan alleen als:

- U de aandoening langer dan 1 jaar hebt.
- De kromstand al 6 maanden niet meer erger wordt
- U al 6 maanden geen pijn meer hebt tijdens een erectie.

Vorbereiding op de operatie

Preoperatief spreekuur

Bij uw operatie wordt anesthesie (verdooving) gebruikt. Om u veilig anesthesie te kunnen geven, is er informatie over uw gezondheid nodig. U krijgt hiervoor een afspraak bij het POS. Daar hebt u onder andere een gesprek met de anesthesioloog over de verdooving.

De afdeling Opnameplanning neemt contact met u op om een datum voor het POS af te spreken. U ontvangt daarna:

- Een afspraakbevestiging.
- De informatie “Zorg rondom uw operatie of behandeling”.
- Een uitnodiging voor het invullen van een gezondheidsvragenlijst.

Bloedverduuners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, stopt u hier een aantal dagen voor de operatie mee in overleg met de uroloog.

Opname

Voor deze operatie wordt u 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis.

Meenemen

Wilt u een strakke onderbroek meenemen naar het ziekenhuis?

De operatie

Tijdens de operatie wordt de huid van de penis bij de eikel en bij het zwellichaam losgemaakt. Met een infuus brengt de uroloog de penis in erectie. Daarna worden hechtingen geplaatst in het zwellichaam aan de lange kant van de kromming, waardoor de penis rechtgetrokken wordt. De penis is daardoor na deze ingreep iets korter dan voorheen. Het verschil kan enkele millimeters tot soms 2 centimeter zijn. Om een nabloeding tegen te gaan, wordt er een drukverband om de penis aangebracht.

Bij deze operatie is soms een besnijdenis nodig. Dit betekent dat de eikel daarna niet meer bedekt zal zijn met voorhuid.

Soms wordt tijdens de operatie een katheter ingebracht. Dit is een dun slangetje dat door de plasbuis naar de blaas gaat. Via deze katheter kan de urine het lichaam verlaten. Zo krijgt de wond rust.

Na de operatie

- De dag na de operatie wordt het drukverband verwijderd. U moet daarna een strakke onderbroek aantrekken.
- Soms is het nodig dat u nog een nacht in het ziekenhuis blijft.
- De katheter wordt verwijderd na overleg met uw behandelend arts.
- De penis kan dik en pijnlijk zijn. De balzak of de penis kan blauw worden en er kan wat bloed of vocht uit de wondjes komen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

- Als er uit het wondje op de penis nog bloed of vocht komt, kunt u een gaasje gebruiken. Als een gaasje niet nodig is, kunt u het wondje beter droog laten. Het geneest dan sneller.

Controleafspraak

U krijgt een afspraak mee voor een controlebezoek bij de polikliniek Urologie.

Adviezen en leefregels

- Als u voor de operatie medicijnen gebruikte die uw bloed verdunnen, start u hier weer mee na overleg met uw behandelend arts.
- Tegen de pijn mag u paracetamol nemen, maximaal 4 keer per dag 1000 mg.
- De eerste 3 weken na de operatie:
 - Mag u wel douchen, maar niet baden of zwemmen.
 - Mag u geen seks hebben.
 - Wordt fietsen afgeraden.
- De eerste weken na de operatie kunnen vooral de nachtelijke erecties pijnlijk zijn. Als u daar veel last van hebt, kunt u hiervoor medicijnen krijgen via uw behandelend arts.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op complicaties. Heel soms komt er bij deze operatie een wondinfectie of een nabloeding voor.

Wanneer contact opnemen

U moet contact opnemen als:

- U erge pijn hebt die niet verdwijnt met de voorgeschreven pijnstillers.
- U koorts hebt boven de 38.5°C.
- Er een sterke zwelling is van de penis of de balzak.
- De wondjes blijven bloeden.
- U niet kunt plassen.

De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur.

T: 0515 - 48 84 00.

Buiten de openingstijden van de polikliniek kunt u contact opnemen met de Dokterswacht.

Tot slot

Deze folder geeft u algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw uroloog aan u verteld worden.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantoniushuis.nl