

Cardiologie

TEE

Echocardiografie via de
slokdarm

Uw krijgt een echocardiografie via de slokdarm. Uw arts heeft u uitgelegd waarom dit onderzoek bij u gedaan wordt.

Als u problemen hebt met het doorslikken van voedsel moet u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. De contactgegevens vindt u onderaan deze folder.

Dit onderzoek is gepland op:

Datum:.....dag.....20.....

Tijd:.....uur

U kunt zich melden bij de polikliniek Cardiologie (route 9).

Doel

U krijgt een echo via de slokdarm als een gewone echo te weinig informatie oplevert. Doordat de slokdarm en het hart tegen elkaar aan liggen, kunnen de dieper gelegen gedeelten van uw hart in beeld worden gebracht.

Vorbereiding

Het onderzoek kan alleen gedaan worden als uw maag leeg is.

- Vanaf minimaal 4 uren voor het onderzoek mag u niets eten of drinken, ook geen water. U mag uw medicijnen wel innemen met een slokje water.
- Als u sedatie (slaapmedicijnen) krijgt, moet u minimaal 6 uren voor het onderzoek nuchter zijn. Zorg ervoor dat iemand u begeleidt naar het ziekenhuis en weer ophaalt. Zie voor meer informatie de folder: "Sedatie bij een onderzoek of behandeling".

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Cardiologie. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte. Voordat het onderzoek begint, verdooft een hartfunctielaborant uw keel met een spray. Als u een gebitsprothese hebt, wordt u verzocht deze uit te doen. Nu wordt voorzichtig, terwijl u slikt, een flexibele slang (de echoscoop) in uw slokdarm gebracht.

Deze echoscoop heeft een dikte van ongeveer 1 centimeter.

Bij het maken van de echo-opnames kan de echoscoop in verschillende posities gedraaid worden. Dit kan een kriebelend gevoel geven.

U hoeft zich geen zorgen te maken over benauwdheid. Omdat de ademweg vrij blijft, kunt u gewoon blijven ademen.

Het inbrengen en verwijderen van de slang kan braakneigingen geven. Dit kunt u proberen te onderdrukken door te zuchten en door uw neus te ademen.

Soms is het nodig om voor het onderzoek een infuusnaald in een ader van uw arm in te brengen. Hierdoor wordt een kleine hoeveelheid vloeistof toegediend. Dit om een eventueel defect in het tussenschot van uw hart aan te tonen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. U kunt na het onderzoek weer naar huis. Als u sedatie hebt gehad, blijft u nog ongeveer 1 tot 2 uur op de hartbewaking voordat u weer naar huis mag.

Na het onderzoek

In verband met de verdoving van uw keel is het belangrijk dat u het eerste uur na het onderzoek niets eet of drinkt. Zo voorkomt u dat u zich verslikt. Uw keel kan nog een dag gevoelig blijven.

Risico's

Er is een zeer kleine kans op voorbijgaande hartritmestoornissen. Ook is er een kleine kans op beschadiging van uw slokdarm.

De uitslag

U krijgt direct na het onderzoek van de cardioloog de voorlopige uitslag te horen. Het kan ook zijn dat u een afspraak meekrijgt voor de uitslag bij uw eigen behandelend cardioloog.

Contact

Hebt u nog vragen? De polikliniek Cardiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:00 uur.

T: 0515 - 48 89 80.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl