

De baarmoederfoto

De baarmoederfoto

Het maken van een baarmoederfoto is onderdeel van het vruchtbaarheidsonderzoek en vindt plaats op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.

Doel van het onderzoek

Er wordt bij het onderzoek gekeken naar:

- Afwijkingen in de vorm van de baarmoeder.
- De toe- en doorgankelijkheid van beide eileiders.
- Eventuele verklevingen in de buikholtte.

Vorbereidingen

Wanneer u menstrueert, belt u voor een afspraak met de polikliniek Gynaecologie. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur.

Telefoonnummer: 0515 - 48 89 83.

U ontvangt van de assistente een recept voor antibiotica. U kunt deze tabletten bij uw eigen apotheek halen. U moet minimaal 12 uur vóór de foto de tabletten innemen. Dit is om te voorkomen dat er tijdens het maken van de foto een infectie vanuit de baarmoedermond ontstaat.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen die op 1 dag worden gepland. Het eerste deel wordt altijd in Sneek gedaan. Voor het tweede deel kunt u kiezen voor locatie Sneek of locatie Emmeloord.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. Het onderzoek wordt door een gynaecoloog of Physician Assistent (PA) gedaan. De gynaecoloog of PA wordt hierbij geassisteerd door een radiologisch medewerker. Het onderzoek wordt gedaan ná de menstruatie en vóór de eisprong.

- Het eerste deel van het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Door de gynaecoloog of PA wordt een dunne katheter in de baarmoeder geplaatst waardoor een vloeistof door de baarmoeder en eileiders wordt gespoten. Het plaatsen van de katheter in de baarmoeder en het inspuiten van de vloeistof kan pijnlijk zijn. Hierna kunt u het ziekenhuis verlaten.

- Ongeveer 7 uur na het eerste deel volgt het tweede deel van het onderzoek, dat bestaat uit het maken van een controlefoto. Deze foto van de onderbuik (zonder doorspuiting) wordt gemaakt om te zien of de contrastvloeistof zich goed tussen de darmen heeft verdeeld. Als de vloeistof zich niet goed heeft verdeeld, kan dat wijzen op verklevingen in de buikholte. Dit onderzoek is volledig pijnloos en duurt ongeveer 5 minuten.

Na het onderzoek

We adviseren u om na het eerste onderdeel van het onderzoek niet zelf naar huis te rijden of alleen met het openbaar vervoer te gaan, maar iemand mee te nemen die u vergezelt.

Na het onderzoek kunt u een wat kramperig gevoel in de onderbuik hebben. Dit is normaal. In zeldzame gevallen kan er toenemende buikpijn met hoge koorts (boven 38°C) optreden. Neem in dat geval contact op met de polikliniek Gynaecologie.

De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur.

Telefoonnummer: 0515 - 48 89 83.

Buiten bovenstaande dagen en tijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

De uitslag

Nadat de onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt de uitkomst besproken in het gynaecologisch team. Deze bespreking is iedere eerste dinsdag van de maand. Na deze bespreking ontvangt u een uitnodiging om de uitslagen met uw gynaecoloog te bespreken.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

Telefoonnummer: 0515 - 48 89 83.

**Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17
8531 EB Lemmer**

**Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek**

**Telefoon
0515 - 48 88 88**

www.mijnantonius.nl

02-07-2018