

Geriatric

Galantamine

Wat is galantamine en waarvoor wordt het gebruikt?

Galantamine is een medicijn tegen dementie. Het wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van milde tot matig ernstige dementie van het Alzheimerstype. Deze ziekte verandert de hersenfunctie.

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dit is een aandoening waarbij de cellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren. Geleidelijke achteruitgang, meestal in eerste instantie in denkvermogen en geheugenstoornissen, is kenmerkend.

De symptomen (verschijnselen) van de ziekte van Alzheimer zijn: toenemend geheugenverlies, verwardheid en gedragsveranderingen. Hierdoor wordt het uitvoeren van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker.

Hoe werkt galantamine?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde boodschapperstoffen nodig (de zogenaamde neurotransmitters). Bij een tekort aan deze boodschapperstoffen ontstaan er problemen met de cognitieve functies. Dat zijn functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden.

Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Dit is een stof die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen hersencellen. Men vermoedt dat de symptomen van Alzheimer een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op deze manier de symptomen van de ziekte kunnen verbeteren.

Galantaminecapsules zijn gemaakt in een vorm met “verlengde afgifte”. Dit betekent dat ze het medicijn langzamer afgeven.

Hoe wordt galantamine gebruikt?

Galantaminecapsules moeten iedere ochtend worden ingenomen met water of een andere vloeistof. Bij voorkeur tijdens het ontbijt.

Galantaminecapsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Ze mogen niet worden gekauwd of geplet.

Meestal wordt het onderstaande doseringsschema gebruikt:

- Week 1 t/m 4 8 mg galantamine/dag 1 x per dag
- Week 5 t/m 8 16 mg galantamine/dag 1 x per dag
- Vanaf week 9+ 24 mg galantamine/dag 1 x per dag

Let op: uw arts of verpleegkundig specialist kan voor een andere opbouw van het schema kiezen. Volg altijd de voorgeschreven opbouw.

In verband met de werking en mogelijke bijwerkingen is het verstandig galantamine onder toezicht van familie of de thuiszorg in te nemen.

Wat zijn de bijwerkingen van galantamine?

De meest voorkomende bijwerkingen van galantamine zijn: misselijkheid, overgeven en soms diarree en hoofdpijn. Voor een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen kunt u de bijsluiters van galantamine bekijken (deze hebt u van uw apotheek gekregen).

Als er bijwerkingen zijn, is dat meestal:

- Bij het starten met galantamine.
- Bij het ophogen van de dosis.
- Als galantamine niet bij de maaltijd wordt ingenomen.
- Als er een extra capsule wordt ingenomen (omdat vergeten is dat er al eentje genomen is).

Om bijwerkingen te voorkomen, is het belangrijk om over de hele dag minstens 1,5 liter te drinken.

De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen. De arts of verpleegkundig specialist kan u eventueel tijdelijk een medicijn tegen misselijkheid geven.

Als u denkt dat u last hebt van bijwerkingen, neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie. De contactgegevens vindt u onderaan deze folder.

Verander de dosis nooit zonder overleg met de arts of verpleegkundig specialist.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Geriatrie. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.

Telefoonnummer: 0515 - 48 81 93.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 - 48 88 88

www.mijnantonius.nl

02-11-2018