

Urologie / Kindergeneeskunde

Opheffen van een vernaauwde voorhuid

Preputiumplastiek

In overleg met de arts zal bij uw zoon een preputiumplastiek worden gedaan. Dit is een ingreep waarbij een vernauwing in de voorhuid (preputium) wordt opgeheven.

Vorbereiding

Bij deze ingreep wordt anesthesie (verdoxing) gebruikt. Om uw zoon veilig anesthesie te kunnen geven, is er informatie over zijn gezondheid nodig. Uw zoon krijgt hiervoor een afspraak bij het POS (preoperatief spreekuur). Daar hebben u en uw zoon onder andere een gesprek met de anesthesioloog over de verdoxing.

De afdeling Opnameplanning neemt contact met u op om een datum voor het POS af te spreken. U ontvangt daarna:

- Een afspraakbevestiging.
- De informatie "Zorg rondom de behandeling of operatie van uw kind".
- Een uitnodiging voor het invullen van een gezondheidsvragenlijst.

De ingreep

Uw zoon wordt opgenomen op de afdeling dagbehandeling van de Kinderafdeling. De ingreep wordt gedaan op de operatiekamer.

Bij deze ingreep wordt de voorhuid ingeknipt en gehecht zodat de voorhuid ruimer wordt. Er worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze hechtingen hoeven later dus niet verwijderd te worden.

De hele ingreep duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Uw zoon mag dezelfde dag weer naar huis.

Na de ingreep

De wond en wondverzorging

- De wond moet de eerste dagen rust hebben.
- Uw zoon kan het beste een strakke onderbroek dragen (geen wijde boxershort). Een strakke onderbroek geeft de penis een betere ondersteuning waardoor de wond meer rust krijgt.
- Als er wat bloedverlies is, houd de penis dan ongeveer 10 minuten met een schoon gaasje aan de bovenkant stevig vast. Meestal stopt het bloeden dan vanzelf.
- Douchen mag vanaf de dag na de ingreep. Na het douchen moet de wond worden drooggedept. In bad gaan mag vanaf 1 week na de ingreep.
- Vanaf de dag na de ingreep moet de voorhuid 2 keer per dag voorzichtig worden teruggeschoven, schoongespoeld en drooggedept. Hierbij mag geen zeep worden gebruikt. Doe dit tot de wond genezen is.

Pijn

- Uw zoon heeft enkele dagen een pijnlijk gevoel. U krijgt een advies voor pijnstilling met paracetamol en een verdovende gel mee.
- Ook kan uw zoon enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen; dit verdwijnt gewoonlijk weer.

Hechtingen

- De hechtingen lossen meestal na 2 weken op.
- Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze kunnen gaan schrijnen. Haal deze korstjes er niet af, ze vallen er vanzelf af.

Sporten

- Sporten en zwemmen kan weer vanaf 2 weken na de ingreep.

Wanneer moet u contact opnemen

Neem contact op met de polikliniek Urologie:

- Als het bloeden niet stopt.
- Als uw kind koorts krijgt boven de 38,5° C.
- Als de pijn erger wordt.
- Als uw kind niet meer kan plassen.

De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 tot 16:00 uur.

T: 0515 - 48 84 00.

Buiten deze uren kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met de Dokterswacht.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor een controlebezoek op de polikliniek Urologie.

Tenslotte

Deze folder geeft u algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door de uroloog aan u verteld worden.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantoniushuis.nl