

## Pijnmedicijnen thuis

Met een goede pijnbehandeling herstelt uw kind sneller. Het is belangrijk dat u daar thuis nog 2 dagen mee doorgaat.

**Medicijn:** paracetamol  
\_\_\_\_\_ keer per dag

**Dosering:** \_\_\_\_\_ mg zetpil/tablet

De pijnmedicijnen werken het best als uw kind ze op vaste tijden inneemt, ook als uw kind weinig last heeft van pijn.

### Innametijden

uur	uur	uur	uur
-----	-----	-----	-----

Vanaf de 3e dag thuis geeft u alleen paracetamol als uw kind pijn heeft.

### Neem contact op als uw kind:

- Koorts krijgt die hoger is dan 38,5°C.
- Meer last krijgt van pijn.
- Een nabloeding heeft.

### Binnen de eerste 24 uur na ontslag:

- Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 16:00 belt u de polikliniek:  
[www.mijnantonius.nl/telefoonnummers-poliklinieken](http://www.mijnantonius.nl/telefoonnummers-poliklinieken)
- Buiten de openingstijden van de polikliniek belt u de Spoedeisende Hulp (SEH).  
T: 0515 - 48 81 05

Vanaf 24 uur na ontslag belt u met uw huisarts of met de huisartsenpost.

*Hebt u opmerkingen of tips over deze informatie?  
Wij ontvangen ze graag via [folders@mijnantonius.nl](mailto:folders@mijnantonius.nl)*