

Radiologie &  
Nucleaire geneeskunde

# Plaatsbepaling van een afwijking in borst of oksel met een magneetzaadje

Er is een afwijking in uw borst(en) of oksel gevonden die niet te voelen is. Daarom wordt voor de operatie de plaats van de afwijking opgezocht en wordt er een klein magneetzaadje ingebracht. Daarmee kan de chirurg de afwijking tijdens de operatie precies vinden.

## Vorbereiding

- U mag op de dag van de plaatsbepaling geen poeder, zalf, bodylotion of deodorant op uw bovenlichaam gebruiken.
- Gebruikt u medicijnen om uw bloed te verdunnen? Dan hebt u met uw chirurg overlegd of u daar voor de plaatsbepaling mee moet stoppen. Als u hierover vragen hebt, kunt u bellen met de polikliniek Chirurgie. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:00 uur. **T: 0515 - 48 89 81.**

## De plaatsbepaling

Nadat u zich bij de zuil hebt gemeld, kunt u in de wachtruimte gaan zitten. U wordt opgeroepen. De plaatsbepaling wordt door een radioloog en 1 of 2 röntgenlaboranten gedaan.

- U gaat op een onderzoektafel liggen.
- Op de huid van uw borst of oksel wordt een gel gedaan.
- De radioloog zoekt met een echoapparaat de plaats van de afwijking.
- U krijgt een plaatselijke verdoving.
- De radioloog maakt een klein sneetje en brengt het magneetzaadje met een naald op de juiste plaats in. Ondanks de verdoving kan dit gevoelig zijn.
- Er worden röntgenfoto's (mammografie) gemaakt om te controleren of het magneetzaadje op de juiste plaats zit.
- Het wondje wordt met een gaasje en een pleister afgeplakt.

De plaatsbepaling duurt ongeveer 30 minuten.

## Na de plaatsbepaling

- Soms ontstaat er een bloeduitstorting door een onderhuidse nabloeding. Is het magneetzaadje in uw borst(en) geplaatst? Draag dan de eerste 24 uur na de plaatsbepaling een stevige beha. Hiermee wordt nabloeding zoveel mogelijk voorkomen.
- U mag het gaasje en de pleister op de avond na de plaatsbepaling weghalen.

- U mag vanaf de avond na de plaatsbepaling douchen.
- Als u pijn hebt, kunt u paracetamol gebruiken. Neem tot 2 dagen na de plaatsbepaling maximaal 4 keer per dag 1000 mg.

## **De operatie**

De operatie wordt minimaal 1 week na het inbrengen van het magneetzaadje gedaan.

De chirurg verwijdert dan de afwijking samen met het magneetzaadje.

Het weggenomen weefsel wordt tijdens de operatie op de afdeling Radiologie gefotografeerd. De chirurg kan dan beoordelen of de afwijking helemaal is verwijderd. Het weefsel wordt daarna voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium in Leeuwarden.

## **Uitslag**

De uitslag van de operatie en van het opgestuurde weefsel krijgt u na een week van uw behandelend specialist.

## **Schadelijkheid**

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt de hoeveelheid straling zo klein mogelijk gehouden.

## **Contact**

Hebt u vragen? De verpleegkundig consulenten Mammacare zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 9:30 en van 13:00 tot 13:30 uur.  
T: 0515 - 48 83 70.

Buiten de spreekuurtijden kunt de voicemail inspreken met uw naam en geboortedatum. De consulent belt u dan binnen 24 tot 48 uur terug.

De consulenten zijn ook per e-mail bereikbaar:

E: [mammacare@mijnantonius.nl](mailto:mammacare@mijnantonius.nl)

## **Meer informatie**

Op de Antonius website leest u meer over, de voordelen van, deze techniek:

[www.mijnantonius.nl/nieuws/nieuwe-lokalisatietechniek-bij-borstsparende-operaties.htm](http://www.mijnantonius.nl/nieuws/nieuwe-lokalisatietechniek-bij-borstsparende-operaties.htm)

***Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?***

*Wij ontvangen ze graag via [folders@mijnantonus.nl](mailto:folders@mijnantonus.nl)*