

Chirurgie

Operatieve verwijdering van een cyste in uw hals

Laterale hals cyste



Binnenkort wordt u opgenomen voor het operatief verwijderen van een cyste in uw hals.

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Het is belangrijk om u te realiseren dat de medische situatie van iedere patiënt verschillend is.

Wat is een hals cyste

Een cyste is een niet oorspronkelijke holte in het lichaam waar vocht in zit. In dit geval ligt de cyste aan de zijkant in de hals. De cyste ontstaat tijdens de ontwikkeling als embryo en kan lang ongemerkt aanwezig zijn. Het is meestal goedaardig, maar kan in zeer zeldzame gevallen kwaadaardig zijn.

Klachten

Als de cyste zich vult met vocht en groter wordt, kan dit klachten geven. De klachten bestaan uit een zwelling in de hals, die hinderlijk kan zijn met bewegen of tijdens het liggen. Soms wordt de zwelling groter en pijnlijk doordat de cyste ontstoken is.

Behandelingsmogelijkheden

Behandeling van een ontsteking

Als de cyste ontstoken is, schrijft uw arts vaak eerst antibiotica voor, voordat tot een operatie wordt overgegaan.

Operatie

De operatie wordt gedaan onder algehele narcose. Zodra u onder narcose bent, verwijdert de chirurg de cyste via een snede in de hals. De cyste zal na de operatie worden opgestuurd voor weefselonderzoek.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u extra in de gaten gehouden wordt. Als uw toestand zo is dat u naar de afdeling kunt, wordt u opgehaald door de verpleegkundige.

Pijn

Na de operatie hebt u meestal weinig pijn. De pijn wordt veroorzaakt door de wond en soms door de houding van het hoofd tijdens de operatie. Tegen de pijn is over het algemeen een eenvoudige pijnstiller (Paracetamol) voldoende.

Zwelling

Rond de wond treedt vaak een kleine zwelling op, die na verloop van enkele weken weer verdwenen is. Een forse zwelling kan wijzen op een ontsteking of bloeditstorting.

Gevoelszenuw

Om een hals cyste zo goed mogelijk te verwijderen, kan uw arts niet alle kleine gevoelszenuwen van de huid rond de snee behouden. Hierdoor hebt u na de operatie een verdoofd gevoel in het gebied van de operatie. Na verloop van enkele maanden wordt het verdoofde gebied steeds kleiner en herstelt het meestal helemaal. Als het gevoel niet helemaal normaal wordt, is dat in het dagelijks leven nauwelijks hinderlijk.

Litteken

Het litteken ligt in een bestaande huidplooi, waardoor het na enkele maanden nauwelijks meer zichtbaar is.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo is de kans op complicaties bij een operatie zoals nabloeding of wondinfecties ook bij een operatie aan een hals cyste aanwezig,

Naar huis

Meestal gaat u de dag na de operatie naar huis.

Controle

Bij het ontslag krijgt u een afspraak mee voor een controle bij de chirurg (7-14 dagen na de operatie). 2 dagen ná de operatie kunt u het verband verwijderen, hechtstrips moeten blijven zitten tot de eerste afspraak voor een controle. U mag dan weer kort douchen als de wond maar bedekt is met een pleister. Na één week kunt u weer in bad of zwemmen. Tijdens de controle krijgt u ook de uitslag van het weefselonderzoek en wordt de wond gecontroleerd. Eventuele hechtingen zullen worden verwijderd.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Chirurgie

Telefoonnummer: (0515) 48 89 81.

Bij overmatige pijn en/of doorbloeden van de wond kunt u contact opnemen met de poli Chirurgie.

Telefoonnummer (0515) 48 89 81 (op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur).

Buiten kantooruren belt u met de Spoed Eisende Hulp via de receptie van het ziekenhuis.

Telefoonnummer (0515) 48 88 88.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 - 48 88 88

www.mijnantonius.nl

25-01-2017