

Radiologie & Nucleaire
geneeskunde

PICC-lijn

(perifeer ingebrachte
centraalveneuze katheter)

Een PICC-lijn is een dun slangetje (katheter) dat via een ader in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de lijn komt tot boven het hart.

Via de PICC-lijn kunnen medicijnen of chemotherapie worden gegeven zonder dat u steeds opnieuw geprikt hoeft te worden. Ook bloedafname kan via de PICC-lijn. De lijn kan, als dat nodig is, vele maanden blijven zitten.

Het inbrengen van een PICC-lijn wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde, locatie Sneek.

Duur van de behandeling

Het inbrengen van de katheter duurt ongeveer 30 minuten.

Voor de behandeling

- U mag eten en drinken zoals u gewend bent.
- Uw specialist heeft met u besproken of u moet stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. Hebt u daarover nog vragen? Neem dan contact op met uw specialist.
- Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Radiologie. De contactgegevens vindt u onder het kopje Contact. Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek wordt het dan aangepast of uitgesteld.

Opname

U bent al opgenomen in het ziekenhuis of er wordt voor u een dagopname afgesproken voor het inbrengen van de PICC-lijn. De afdeling Planning informeert u over de dag en tijd van uw behandeling.

U krijgt ook een e-mail of een afspraakbrief met verdere informatie.

De behandeling

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de gastvrouw/-heer in de centrale hal van het ziekenhuis. U wordt naar de afdeling gebracht. Daar wordt u voorbereid op de behandeling. U krijgt een speciaal jasje aan en u krijgt verdere uitleg. U wordt in een bed of rolstoel naar de afdeling Radiologie gebracht.

De behandeling wordt gedaan door een radioloog en 1 of 2 laboranten.

- U gaat op een onderzoektafel liggen.
- De radioloog bekijkt met echografie op welke plek in de bovenarm de PICC-lijn het beste kan worden ingebracht.
- U komt onder steriele lakens te liggen, waarbij uw hoofd vrij blijft.
- De prikplaats wordt verdoofd.
- De radioloog prikt de ader aan en kijkt met echografie of de naald goed zit.
- De PICC-lijn wordt ingebracht en de ligging van de katheter wordt met röntgen gecontroleerd.
- Een klein gedeelte van de PICC-lijn blijft zichtbaar op uw bovenarm. Daar kunnen later de medicijnen op worden aangesloten.
- Het steriele laken kan van u af en de aanprikplaats wordt afgedekt met een steriele pleister en verband.
- U krijgt een Katheter-ID-kaart.

Na de behandeling

U wordt teruggebracht naar de afdeling, waar u nog uitgebreide informatie krijgt van de verpleegkundige over de nazorg. Als u alleen voor het inbrengen van PICC-lijn bent opgenomen, kunt u daarna naar huis.

Schadelijkheid

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De afdeling Radiologie & Nucleaire is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:15 uur.

T: 0515 - 48 85 20.

Tot slot

Deze folder geeft algemene informatie. Het kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl