

Urologie

Naar huis met een suprapubische katheter



Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

U hebt een suprapubische katheter gekregen. Uw arts heeft met u besproken waarom dat nodig is. In deze folder vindt u adviezen en informatie over hoe u kunt omgaan met uw katheter.

Een suprapubische katheter

Een suprapubische katheter is een dun soepel slangetje dat door de uroloog via een sneetje in de buikwand, net boven het schaambeentje, in de blaas is ingebracht. Door dit slangetje kan de urine uit uw blaas lopen. Aan het einde van het slangetje zit een ballonnetje. Dit ballonnetje wordt na het inbrengen van de katheter met water gevuld, zodat de katheter niet uit de blaas kan glijden.

Het opvangsysteem

- De urine wordt via de katheter afgevoerd naar een katheterzak (opvangzak). Er zijn 2 soorten katheterzakken, de dagzak (of beenzak) en de nachtzak.
- U kunt ook een katheter hebben met alleen een kraantje. Via dit kraantje kunt u de blaas direct in het toilet legen.

Overdag

Opvangzak: U draagt de kleinere dagzak. Deze kunt u met een fixette (afbeelding 1) of met klittenbanden (afbeelding 2) om uw been vastmaken. Onderaan de dagzak zit een aftapkraantje. Hiermee kunt u de zak legen. Als het onder de beenzak gaat broeien, kunt u een washandje tussen uw been en de beenzak leggen.

Kraantje: Ga om de 3 uur naar het toilet om de blaas via het kraantje (afbeelding 3) te legen.



Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3

- **'s Nachts**

Sluit de grotere nachtzak aan op de beenzak (afbeelding 4) of op het kraantje.



Afbeelding 4

U kunt de nachtzak met een ophangstelsel aan uw bedrand hangen of in een emmer naast uw bed zetten. Onderaan de nachtzak zit een kraantje waarmee u de zak kunt legen.

Belangrijk:

- De opvangzak moet altijd lager hangen dan de uitgang van de katheter, zodat de urine gemakkelijk via de katheter in de opvangzak kan lopen.
- Er mag geen knikje in de katheter zitten.
- Let er goed op dat de kraantjes op de juiste momenten open of dicht zijn.

U krijgt een pakket met zakjes en andere materialen mee voor thuis. Bij dit pakket zit ook een uitleg over hoe u nieuwe materialen kunt bestellen.

De opvangzak legen

- Open het aftapkraantje door het voorzichtig naar beneden te schuiven.
- Laat de urine in het toilet lopen.
- Sluit het kraantje!
- Droog het puntje van het aftapkraantje af met een stukje toiletpapier.

De opvangzak verwisselen

- Zorg dat de materialen die u nodig hebt binnen handbereik zijn.
- Het is verstandig om een handdoek onder de katheter te leggen, voor het geval u urine morst.
- Open de verpakking en haal de nieuwe opvangzak eruit.
- Verwijder de beschermdop van de nieuwe opvangzak.
- Pak de katheter met 1 hand vast en knik deze tussen de duim en de wijsvinger zodat er geen urine uit kan lopen.
- Haal de gebruikte opvangzak weg.
- Sluit de nieuwe opvangzak aan op de katheter.
- Gooi de gebruikte opvangzak in de vuilnisbak.

Als er geen urine meer in de opvangzak loopt

Als er geen urine meer doorloopt, controleer dan of:

- Er een knik in de slang van de blaaskatheter zit.
- U voldoende drinkt.
- De katheterzak niet te hoog hangt.
- De katheter verstopt zit. Dit kunt u soms oplossen door even in de slang te knijpen.

Verzorging van de insteekopening

Bij het plaatsen van de katheter is via een sneetje de insteekopening gemaakt. Na de operatie hebt u daar een wondje en op dit wondje is een gaasje gekomen. Om infectie te voorkomen, moet u de insteekopening goed verzorgen. Vervang daarom iedere keer het gaasje als u hebt gedoucht. Doe dit totdat de insteekopening niet meer bloedt, dan hoeft er geen gaasje meer op. De katheter moet iedere dag gedraaid worden om vastgroeien te voorkomen.

Leefregels

- Drink voldoende (2 liter per dag) om een blaasontsteking en verstopping van de katheter te voorkomen.
- Houd ook de stoelgang in de gaten. Een volle darm kan namelijk op de katheter drukken en het doorlopen van urine moeilijker maken.
- Trek niet aan de katheter. Dit kan de blaas beschadigen en u kunt de katheter verliezen.
- Verschoon dagelijks uw onderkleding.

Blaaskrampen

Door irritatie van de katheter of door een infectie kunt u blaaskrampen krijgen. Bij blaaskrampen trekt de blaas samen waardoor er urine langs de katheter naar buiten wordt geperst. U hebt dan vaak pijn laag in de buik, net boven de schaamstreek en kunt soms urine verliezen.

Verwisselen van de katheter

Vaak wordt de katheter na 6 weken voor de eerste keer verwisseld. Dit gebeurt op de polikliniek Urologie. U krijgt daarvoor een afspraak mee.

Afhankelijk van de soort katheter, moet de katheter daarna iedere 6 tot 12 weken worden verwisseld. Het verwisselen kan dan ook thuis gebeuren of bij uw huisarts.

Wanneer contact opnemen

Neem contact op met uw arts als:

- De katheter eruit valt. **Dit is een spoedsituatie.** De katheter moet dan zo snel mogelijk worden vervangen.
- U koorts krijgt hoger dan 38,5° C.
- Er 2 tot 3 uren lang geen urine meer is doorgelopen.
- Er bloed in de urine zit en dit niet verdwijnt door meer te drinken.
- U blaaskrampen hebt die niet overgaan.

De eerste 24 uur na uw opname kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH)

T: 0515 - 48 81 05

Vanaf 24 uur na uw opname en tot de afspraak op de polikliniek kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie.

De polikliniek is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur.

T: 0515 - 48 89 95.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Dokterswacht.

Antonius Ziekenhuis

Bolswarderbaan 1, Sneek
T 0515 - 48 88 88

Urkerweg 4, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60

Urkerweg 1, Emmeloord
T 0527 - 48 87 77

Thuiszorg Zuidwest Friesland

Bolswarderbaan 3, Sneek
T 0515 - 46 11 00

www.mijnantonius.nl