

Pijnbestrijding

Behandeling van pijn door middel van een blokkade van het ganglion van Gasser

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat uw pijnklachten worden behandeld door middel van een injectie bij het ganglion van Gasser. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Wat is een blokkade van het ganglion van Gasser

Een ganglion is een zenuwknoop waarin een aantal zenuwbanen samenkomen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Het ganglion van Gasser is de zenuwknoop van de aangezichtsenuw. Bij de behandeling krijgt u een injectie met medicijnen op de plaats waar de aangezichtsenuw door de schedelbasis naar buiten komt. Deze injectie wordt via uw wang gegeven.

Wanneer

Een blokkade van het ganglion van Gasser wordt toegepast bij gordelroos (acute herpes zoster) waarbij de aangezichtsenuw is aangedaan.

Belangrijk om te melden

Neem contact op met de polikliniek Pijnbestrijding als één of meerdere van onderstaande punten op u van toepassing zijn en u dit nog niet hebt besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

- Gebruik van medicijnen om uw bloed te verdunnen. Het kan zijn dat u hiermee enkele dagen voor de behandeling moet stoppen. Op de avond direct na de behandeling mag u deze medicijnen weer gebruiken, behalve als uw arts iets anders met u heeft afgesproken.
- Allergie of overgevoeligheid voor röntgencontrastmiddelen, andere medicijnen of pleisters.
- Een (mogelijke) zwangerschap.
- Suikerziekte.
- Als u onlangs een grieprik hebt gehad of binnenkort krijgt.
- Als u de dagen voor de behandeling veel hoest of koorts heeft.

Afbellen

Neemt u tijdig contact op met de polikliniek Pijnbestrijding als u verhinderd bent op de dag van de behandeling.

Nuchter zijn

In overleg met de pijnspecialist krijgt u tijdens de behandeling sedatie (een roesje). Dit is een medicijn waar u slaperig van wordt. U raakt niet in diepe slaap, maar u hebt hierdoor wel minder last van de ingreep.

Omdat u sedatie krijgt, moet u nuchter zijn voor de behandeling. Dit betekent dat u:

- De dag vóór de behandeling normaal mag eten en drinken.
- Vanaf 6 uren vóór het tijdstip van opname **niets meer mag eten**.
- Tot 2 uren vóór het tijdstip van opname **alleen water en/of limonadesiroop mag drinken**.
- Vanaf 2 uren vóór het tijdstip van opname **helemaal niets meer mag eten en drinken**.

Vorbereiding thuis

- Uw eigen medicijnen (ook pijnstillers) mag u innemen, in overleg met uw arts.
- Na de behandeling kunt u niet zelf deelnemen aan het verkeer. U moet dan ook vervoer regelen voor de terugreis. Laat waardevolle spullen thuis.
- Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.

Wat neemt u mee

- Een lijst van medicijnen die u op dit moment gebruikt.
- Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon.

Waar meldt u zich

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie Opname in de centrale hal van het ziekenhuis.

De behandeling

Als er met u is afgesproken dat u sedatie krijgt, krijgt u voorafgaand aan de behandeling een infuus in de arm. Ook wordt u aangesloten aan apparatuur die uw hartslag en bloeddruk meet. Als u een gebitsprothese en/of gehoorapparaat hebt, moet u die voor de behandeling uitdoen.

De behandeling wordt gedaan op een behandelkamer. Tijdens de behandeling ligt u op de rug. Om te voorkomen dat u per ongeluk met uw handen naar uw gezicht reikt of uw hoofd beweegt, worden uw armen en hoofd tijdelijk gefixeerd (vastgezet). Met behulp van röntgendoorlichting bepaalt de pijnspecialist de plaats die behandeld gaat worden en tekent deze af. Een gedeelte van de huid wordt gedesinfecteerd (schoongemaakt). Daarna wordt de huid plaatselijk verdoofd en wordt er, als u sedatie krijgt, een kortwerkend slaapmiddel in het infuus gespoten.

Als het slaapmiddel is ingewerkt, plaatst de pijnspecialist een dunne naald via uw wang dichtbij de zenuwknop. Als de naald in de goede positie is, wordt een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmer (corticosteroid) toegediend.

Na de behandeling

- Na de behandeling blijft u nog ongeveer 1 uur op de afdeling.
- Wij raden u aan om de dag van de behandeling wat rust te nemen.
- De dag na de behandeling mag u weer doen wat u kunt.

Complicaties en/of bijwerkingen

- Na de behandeling kunt u tijdelijk een doof gevoel hebben in uw wang. Dit dove gevoel kan direct na de behandeling optreden, maar soms ook enkele uren later.
- Door het gebruik van een ontstekingsremmer kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan:
 - o Een warm en koortsig gevoel, met name in het gezicht.
 - o Bij vrouwen kan de menstruatie iets heviger zijn. Ook vrouwen in de menopauze kunnen wat vaginaal bloedverlies hebben.
 - o De anticonceptiepil kan gedurende de cyclus minder betrouwbaar zijn.
 - o Patiënten met diabetes kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedsuikers.
- Er bestaat een kleine kans op een allergische reactie, nabloeding of infectie.

Resultaat van de behandeling

U kunt direct na de behandeling verlichting van uw klachten merken. Het uiteindelijke effect is pas na enkele weken te beoordelen.

Controle afspraak

U wordt na ongeveer een week gebeld door de assistente van de polikliniek Pijnbestrijding. De afspraak daarvoor krijgt u mee op de dag van de behandeling.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.

Telefoonnummer: 0515 - 48 89 92.

U kunt ook een mail sturen naar:
pijninfo@antonius-sneek.nl

Meer informatie over de polikliniek Pijnbestrijding vindt u op:
www.mijnantonius.nl

**Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17
8531 EB Lemmer**

**Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek**

**Telefoon
0515 - 48 88 88**

www.mijnantonius.nl

16-10-2018